

Exercice 1 Soit (u_n) une suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + n - 1$.

1. Donner u_0 , u_1 et u_2 .
2. Exprimer en fonction de n : a) u_{n-1} b) u_{n+1} c) $u_{n+1} - u_n$
3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ?
4. Quel est le sens de variation de (u_n) ?

Exercice 2 Préciser si les suites suivantes (u_n) sont arithmétiques, géométriques, ou ni l'un ni l'autre.

- a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n^2$.
- b. $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n - 5$.
- c. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2n^2 + 5n + 3}{n + 1}$.
- d. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{3^{2n+1}}{2n}$.
- e. $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = -\frac{2}{3}u_n + 4$, puis (v_n) définie par $v_n = u_n - \frac{12}{5}$.

Exercice 3 Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = \frac{n+1}{n^2+1}$.

1. Déterminer la fonction f telle que $u_n = f(n)$.
2. Etudier le sens de variation de f et en déduire celui de (u_n) .
3. Calculer u_{10} , u_{100} , $u_{10\,000}$, u_{10^8} et $u_{10^{16}}$.

Que peut-on dire des valeurs de u_n lorsque n devient de plus en plus grand ?

Exercice 4 Même exercice avec les suites (u_n) définies pour tout entier naturel n par

$$1) \ u_n = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1}. \quad 2) \ u_n = 3n^2 + 4n - 5. \quad 3) \ u_n = -n^3 + 6n^2 - 9n + 5 \quad 4) \ u_n = \frac{1}{2}e^n \quad 4) \ u_n = 3e^{-0,5n+1}$$

Exercice 5 Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{1}{u_n} + 1$.

Déterminer la fonction f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$. Tracer \mathcal{C}_f et placer u_0, u_1, \dots, u_4 sur l'axe des abscisses.

Exercice 6 On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = xe^{-x}$ ainsi que la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , par $u_{n+1} = f(u_n)$.

- a) Dresser le tableau de variations de f et tracer la courbe \mathcal{C}_f de f .
- b) Construire sur le graphique précédent les points A_0 , A_1 et A_2 d'ordonnées nulles et d'abscisses respectives u_0 , u_1 et u_2 .
- c) Conjecturer le sens de variation de la suite et sa limite. *Ces résultats seront démontrés plus tard...*

Exercice 7 (u_n) est la suite définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{3u_n}{3 + 2u_n}$.

Pour tout entier n , on pose $v_n = \frac{3}{u_n}$.

1. Démontrer que (v_n) est une suite arithmétique.
2. En déduire une expression de v_n , puis de u_n en fonction n .

Exercice 8 (u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{1}{6}$.

Pour tout entier n , on pose $v_n = 2u_n + 1$.

1. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique.
2. En déduire une expression de v_n , puis de u_n en fonction n .

Exercice 9 Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$.
Montrer que, pour tout entier n , $0 \leq u_n \leq 3$.

Exercice 10 Montrer que, pour tout $n \geq 10$, $2^n \geq 100n$.

Exercice 11 Soit la suite v définie par $v_0 = 2$, puis pour tout entier n , $v_{n+1} = 1 + \frac{1}{v_n}$.
Montrer que pour tout entier naturel n , $\frac{3}{2} \leq v_n \leq 2$.

Exercice 12 Somme des premiers entiers, de leurs carrés, de leurs cubes.

1. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n , $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n , $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n , $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Exercice 13 Soit n un entier naturel non nul, et S_n la somme : $S_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{p(p+1)}$.

1. Ecrire un algorithme permettant de calculer S_n où n est un entier choisi par l'utilisateur.
2. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $S_n = \frac{n}{n+1}$
3. a) Vérifier que pour tout entier p non nul, $\frac{1}{p(p+1)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}$
b) Retrouver alors le résultat du 1. par une autre méthode.

Exercice 14 Soit a un réel strictement positif. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $(1+a)^n \geq 1 + na$ (inégalité de Bernoulli).

Exercice 15 Soit u la suite définie par $u_0 = 3$, et pour tout entier n par $u_{n+1} = 2(u_n - 1)$.
Calculer les premiers termes de cette suite, et conjecturer une expression de u_n .
Démontrer alors cette conjecture.

Exercice 16 Soit la suite u définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 1}$.
Démontrer que cette suite est monotone.

Exercice 17 Dans chacun des cas suivants, déterminer la limite de la suite (u_n) :

- $u_n = n^3 + \frac{1}{n}$
- $u_n = (3n+1)(-7n+5)$
- $u_n = \frac{3 - \frac{4}{n}}{2}$
- $u_n = n^3 - n^2 + 3n - 1$
- $u_n = \frac{2n^2 + 1}{-n^2 + 6}$
- $u_n = \frac{n^2 + 3n - 5}{n^3 - 6n^2 + 1}$
- $u_n = n\sqrt{n} - n$
- $u_n = (-2n+3)\frac{n+3}{-n^2 + n + 6}$
- $u_n = \frac{n}{n + \sqrt{n}}$
- $u_n = \frac{9 - n^2}{(n+1)(2n+1)}$
- $u_n = \frac{1}{3} - \frac{n}{(2n+1)^2}$
- $u_n = \frac{2}{3n} - \frac{2n^2 + 3}{3n^2 + n + 1}$

Exercice 18 D'après BAC

(u_n) est une suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$.

- Etudier le sens de variation de (u_n) .
- Démontrer par récurrence que, pour tout entier n , $u_n = (n + 1)^2$.
- En déduire que, pour tout entier n , $u_n \geq n^2$.
- La suite (u_n) est-elle minorée ? majorée ? Justifier.
- Donner la limite de (u_n) .

Exercice 19 Soit (a_n) la suite définie par $a_0 = 1$ et, pour tout entier n , par $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + n - 2$.

- a) Quelle est la valeur retournée lors de l'appel `fonction(3)` de la fonction python ci-contre ?
`for i in range(10): print(fonction(i))`
- Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 7$, on a $a_n \geq n - 3$.
- En déduire la limite de la suite (a_n) .

```
def fonction(n) :
    a=1
    for p in range(n) :
        a=1/3*a+p-2
    return(a)
```

Exercice 20 Soit la suite u définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 1}$

- Montrer que (u_n) est décroissante.
- Montrer que la suite (u_n) est minorée.
- En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 21 Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$.

- Montrer que cette suite est croissante.
- Montrer que pour tout entier n , $0 \leq u_n \leq 3$. En déduire que la suite (u_n) est convergente.
- Déterminer la limite l de la suite (u_n) .

Exercice 22 On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{3}{2}x$, et la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$, puis pour tout entier n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

- Appliquer le théorème du point fixe à la suite (u_n) .
- Calculer u_0 , u_1 et u_2 et conjecturer l'expression de u_n en fonction de n .
Démontrer cette conjecture. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Quelle est sa limite ?

Exercice 23 Soit la suite u définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier n , par $u_{n+1} = 4 - \frac{3}{u_n}$.

- a) Dans un repère orthonormal (unité graphique 4cm), tracer la droite Δ d'équation $y = x$ et la courbe \mathcal{C}_f représentant la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par l'expression $f(x) = 4 - \frac{3}{x}$.
b) Placer sur l'axe des abscisses, et sans effectuer aucun calcul, les termes u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
c) Quelle conjecture peut-on faire sur la suite u .
- a) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq u_n \leq 3$.
b) Démontrer que la suite u est croissante, et en déduire qu'elle converge.
c) Déterminer alors la limite de la suite u .

Exercice 24 On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = xe^{-x}$ ainsi que la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , par $u_{n+1} = f(u_n)$.

- a) Dresser le tableau de variations de f et tracer la courbe \mathcal{C}_f de f .
b) Construire sur le graphique précédent les points A_0 , A_1 et A_2 d'ordonnées nulles et d'abscisses respectives u_0 , u_1 et u_2 .

- c) Conjecturer le sens de variation de la suite et sa limite.
2. a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier n , on a $u_n > 0$.
- b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
- c) Montrer que la suite (u_n) converge vers une limite l . Déterminer l .

3. On considère la somme $S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

Écrire un algorithme/programme qui permet de calculer S_n pour n quelconque donné.

Calculer S_{100} .

Exercice 25 Soit (S_n) et (T_n) les deux suites définies, pour tout entier naturel n , par

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k} = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{3^k} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{n}{3^n}$$

1. a. Pour tout entier n , exprimer S_n en fonction de n .
- b. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
2. a. Montrer que la suite (T_n) est croissante.
- b. Montrer que, pour tout entier naturel n , $T_{n+1} = \frac{S_n + T_n}{3}$.
- c. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, on a $T_n \leq 1$.
- d. En déduire que la suite (T_n) converge vers un réel l . Déterminer l .

Exercice 26 (u_n) est la suite définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{3u_n}{3 + 2u_n}$.

Pour tout entier n , on pose $v_n = \frac{3}{u_n}$.

1. Démontrer que (v_n) est une suite arithmétique.
2. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 27

1. Soit a un réel strictement positif.

Démontrer par récurrence que pour tout entier n , $(1+a)^n \geq 1 + na$.

2. Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme $v_0 > 0$ et de raison $q > 1$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Exercice 28 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 6$ et la suite (v_n) définie sur \mathbb{N} par $v_n = u_n - 8$.

1. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique.
2. En déduire l'expression de v_n , puis de u_n en fonction de n .
3. Déterminer les limites des suites (v_n) et (u_n) .

Exercice 29 Soit la suite u définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{5u_n - 1}{u_n + 3}$.

1^{ère} méthode a) vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 5 - \frac{16}{u_n + 3}$.

- b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [1; 2]$.
- c) Etablir la relation $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n - 1)^2}{u_n + 3}$, et en déduire le sens de variation de u .
- d) Démontrer que u converge et déterminer sa limite l .

2^{ème} méthode On considère la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.

- a) Prouver que v est une suite arithmétique de raison $\frac{1}{4}$.
- b) Exprimer pour tout n , v_n puis u_n en fonction de n .
- c) En déduire la convergence de u et sa limite.